

ESCLUSIONE PERMANENTE DALLA DONAZIONE

Neoplasie	Qualsiasi ad eccezione del carcinoma alla cervice uterina.
Malattie autoimmuni	Malattia autoimmune che coinvolge più organi o anche monorgano se candidati a procedure che prevedano la somministrazione di fattori di crescita.
Malattia celiaca	Qualora non si adotti una dieta priva di glutine.
Malattie cardiovascolari	Soggetti con malattie coronariche, ivi compresi i portatori di stent aortocoronarici, angina pectoris, aritmia cardiaca grave, storia di malattie cerebrovascolari, trombosi arteriosa o trombosi venosa ricorrente.
Malattie organiche del sistema nervoso centrale	
Trapianto di organo solido, di CSE Diatesi emorragiche, coagulopatie	
Diatesi emorragiche, coagulopatie	Soggetti con tendenza anomala all'emorragia o con diagnosi di coagulopatia su base congenita o acquisita.
Epilessia	Soggetti con diagnosi di epilessia in trattamento anti-convulsivante, o con storia clinica di crisi lipotimiche e convulsive.
Affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche o respiratorie	Soggetti affetti da tali affezioni in forma attiva, cronica, recidivante o che abbiano permanenti danni d'organo causati dalle affezioni indicate.
Diabete	Soggetti in trattamento con insulina e con diabete in labile compenso.
Anafilassi	Soggetti con una documentata storia di anafilassi.
Malattie infettive	Epatite B Epatite C Infezioni da HIV Infezioni da HTLV I/II Malattia di Chagas o Tripanosomiasi americana Babesiosi Lebbra Kala Azar (Leishmaniosi viscerale) Sifilide Febbre Q cronica
Encefalopatia spongiforme (TSE) Malattia di Creutzfeld – Jacob, variante delle malattia di Malattia di Creutzfeld – Jacob	Soggetti che hanno ricevuto trapianto di cornea, sclera o dura madre, o che sono stati trattati con estratti della ghiandola pituitaria, o con antecedenti medici o familiari che comportano un rischio di contrarre TSE;

	soggetti che hanno soggiornato per più di 6 mesi cumulativi nel Regno Unito nel periodo 1980-1996; soggetti che hanno subito intervento chirurgico o trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati nel Regno Unito dal 1980-1996.
Assunzione sostanze farmacologiche	Soggetti con uso attuale o pregresso non prescritto di sostanze farmacologiche o principi attivi, comprese sostanze stupefacenti, steroidi od ormoni a scopo di attività sportive.
Xenotrapianti	Soggetti che hanno ricevuto uno xenotrapianto. (Lo xenotrapianto, è uno speciale tipo di trapianto che utilizza cellule, tessuti e addirittura organi provenienti da un individuo di una specie diversa da quella del soggetto sul quale viene effettuato).
Comportamento sessuale	Soggetti il cui comportamento sessuale abituale o reiterato (promiscuità, occasionalità, rapporti con scambio di denaro o droga) li espone ad elevato rischio di contrarre malattie infettive trasmissibili con il sangue.
Alcolismo cronico	
Farmaci antidepressivi	
Soggetti asmatici	Se in terapia cronica (foster), SOSPESO DEFINITIVAMENTE.

ESCLUSIONE TEMPORANEA DALLA DONAZIONE

Malattie Infettive

Glomerulonefrite acuta	5 anni dalla completa guarigione.
Brucellosi	2 anni dalla completa guarigione.
Osteomielite	2 anni dalla completa guarigione.
Febbre Q	2 anni dalla completa guarigione.
Tubercolosi	2 anni dalla completa guarigione.
Febbre Reumatica	2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica.
Malattia di Lyme	12 mesi dopo la guarigione.
Toxoplasmosi	6 mesi dalla completa guarigione.
Mononucleosi Infettiva	6 mesi dalla completa guarigione.

Malattia di Chagas o Tripanosomiasi americana	I soggetti nati (o con madre nata) in Paesi dove la malattia è endemica, o che sono stati trasfusi in tali Paesi, o che hanno viaggiato in aree a rischio (rurali) e soggiornato in condizioni ambientali favorevoli all'infezione (camping, trekking) possono essere ammessi alla donazione solo in presenza di un test per anticorpi anti-Tripanosoma Cruzi negativo.
Febbre > 38 °C	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi.
Affezioni di tipo influenzale	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi.
Esame endoscopico con strumenti flessibili	4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio.
Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago	4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio.
Trasfusioni di emocomponenti o somministrazione di emoderivati	4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio.
Trapianto di tessuti o cellule di origine umana	4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio.
Tatuaggi o body piercing Foratura delle orecchie	4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio.
Agopuntura, se non eseguita da professionisti qualificati con ago usa e getta	4 mesi dall'ultima esposizione alla condizione di rischio.
Convivenza prolungata e abituale e convivenza occasionale con soggetto, non partner sessuale, con positività per HBsAg e/o HCV	4 mesi dopo la cessazione della convivenza o dall'ultima esposizione. Si applica anche se il donatore è vaccinato per l'epatite B.
Comportamenti sessuali a rischio	4 mesi dall'ultima esposizione ad una o più delle condizioni di rischio, rappresentate da rapporti eterosessuali/omosessuali/bisessuali: Con partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS o a rischio di esserlo; Con partner che ha avuto precedenti comportamenti sessuali a rischio o del quale il donatore ignora le abitudini sessuali; Con partner occasionale; Con più partner sessuali; Con soggetti tossicodipendenti; Con scambio di denaro e droga; Con partner, di cui non sia noto lo stato sierologico, nato o proveniente da paesi esteri dove l'AIDS è una malattia diffusa.
Intervento chirurgico maggiore	4 mesi in condizioni di recupero dello stato di salute.
Gravidanza	Durante la gravidanza. 6 mesi dopo il parto o interruzione di gravidanza eccettuate circostanze particolari e a discrezione del medico che effettua la selezione.

	6 mesi dopo l'allattamento.
--	-----------------------------

Vaccinazioni

Virus o batteri vivi attenuati	4 settimane.
Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi e vaccini ricombinati	48 ore se il soggetto è asintomatico.
Tossoidi	48 ore se il soggetto è asintomatico.
Vaccino dell'Epatite B	7 giorni se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione.
Vaccino dell'Epatite A	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione.
Rabbia	48 ore se il soggetto è asintomatico e se non vi è stata esposizione. 1 anno se il vaccino è stato somministrato dopo l'esposizione.
Vaccini dell'encefalite da zecche	Nessuna esclusione se il soggetto sta bene e se non vi è stata esposizione.
Vaccino Covid19	48 ore in assenza di sintomi. 14 giorni con sintomi. Virus inattivati: 4 settimane.

Altre cause di Esclusione Temporanea

Intervento chirurgico minore	1 settimana dalla completa guarigione clinica.
Mestruazioni	In corso.
Cure odontoiatriche	48 ore per cure di minore entità da parte di odontoiatra o odontogenista. 4 mesi dalla completa guarigione clinica per l'estrazione dentaria non complicata, la devitalizzazione ed altri interventi (es. implantologia). 4 mesi nel caso di innesto di tessuto osseo autologo o omologo
Assunzione farmaci	Rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il principio attivo dei medicinali prescritti, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura. Per i soggetti che assumono farmaci a dimostrato effetto teratogeno, la sospensione dovrebbe essere protratta per un periodo adeguato in rapporto alle proprietà farmacocinetiche del farmaco stesso.
Manifestazioni allergiche gravi, fatta eccezione per lo shock anafilattico, a sostanze con particolare riguardo alla penicillina	2 mesi dopo l'ultima esposizione.

e cefalosporine e veleno di imenotteri	
Talassemia	Da valutare di volta in volta valori di Hb.
Ferritina	Da valutare di volta in volta.
Anti ipertensivi	Se trattasi di farmaco con 3 principi attivi, SOSPENSIONE DEFINITIVA.
Beta bloccanti	Con FC <60 SOSPENSIONE TEMPORANEA.
FANS	5 giorni.
Soggetti asmatici	Sospesi temporaneamente se in fase acuta.
Anoressizzanti	Sospensione per un mese dall'ultima assunzione.
Antibiotici	Sospensione per 14 giorni dall'ultima assunzione a guarigione avvenuta.
ACE-Inibitori	Definitiva sospensione dalle aferesi.
Finasteride e Dutasteride (proscar, prostide)	Sospensione permanente se uso in oncologia. Sospensione di 1 mese dall'ultima assunzione (anche topico) per altre indicazioni.
Terapia ormonale	A discrezione del medico.

N.B. Possono sussistere ulteriori ragioni per la sospensione temporanea o definitiva del donatore ai fini sia della sua protezione che dei riceventi la donazione: la decisione spetta al Medico Responsabile della selezione in considerazione di linee guide e di evidenze scientifiche.